

Föreläsning 2:

Rationella funktioner:

Repetition: En funktion $Q(x) = \frac{f(x)}{g(x)}$ ($f(x), g(x)$ polynom) kallas rationell funktion.

Problem: Bestäm $\int \frac{f(x)}{g(x)} dx$!

Steg I (Polynomdivision)

Om $\deg f(x) \geq \deg g(x)$ så utför vi polynomdivision, dvs. $f(x) = g(x)q(x) + r(x)$, $\deg r(x) < \deg g(x)$.

Vi får $\int \frac{f(x)}{g(x)} dx = \int q(x) + \frac{r(x)}{g(x)} dx$

$\int q(x) dx$ beräknas "lätt"; återstår $\int \frac{r(x)}{g(x)} dx$

där $\deg r(x) < \deg g(x)$.

Steg II (Faktorisering)

Faktorisera nämnaren $g(x)$ så långt det går i reella första- och andragradsfaktorer.

$$\text{Ansätt} \quad \frac{4x+4}{(x-1)(x+3)^2} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{x+3} + \frac{C}{(x+3)^2} \quad (4)$$

(A, B, C konstanter)

Multiplicera bågge led med $(x-1)(x+3)^2$:

$$4x+4 = A(x+3)^2 + B(x-1)(x+3) + C(x-1) \quad (*)$$

$$\Leftrightarrow 4x+4 = (A+B)x^2 + (6A+2B+C)x + (9A-3B-C)$$

Identificering av koefficienter ger

$$(4') \quad \begin{cases} A+B=0 \\ 6A+2B+C=4 \\ 9A-3B-C=4 \end{cases}$$

Linjärt ekv. system.
Det går att använda Gausselimination (lös i så fall ~~läs kap. 3.3~~ själv), annars

använder vi "handräkning":

Sätt in $x=1, x=-3$ i (*)

$$x=1: \quad 4 \cdot 1 + 4 = A(1+3)^2 + B \cdot 0 + C \cdot 0$$

$$\Leftrightarrow 16A = 8 \Leftrightarrow A = \frac{1}{2}$$

$$x=-3: \quad 4 \cdot (-3) + 4 = A \cdot 0 + B \cdot 0 + C \cdot (-3-1)$$

$$\Leftrightarrow -4C = -8 \Leftrightarrow C = 2$$

Ersätt nu i (4'):

(1)

$$\text{Ex (I+II): } Q(x) = \frac{x^5 + 5x^4 + 2x^3 - 14x^2 + x + 13}{x^3 + 5x^2 + 3x - 9}$$

(2)

I) Polynomdivision ger

$$Q(x) = x^2 - 1 + \frac{4x+4}{x^3 + 5x^2 + 3x - 9}$$

II) Vi faktorisar nämnaren. Gissar nollställe $x=1$.

$\Rightarrow x-1$ delar $x^3 + 5x^2 + 3x - 9$. Pol.div. ger

$$x^3 + 5x^2 + 3x - 9 = (x-1)(x^2 + 6x + 9) = (x-1)(x+3)^2$$

$$\Rightarrow \frac{r(x)}{g(x)} = \frac{4x+4}{(x-1)(x+3)^2}$$

Steg III (Partialbråksupplösning)

Vi partialbråksupplösar $\frac{r(x)}{g(x)}$.

$$\text{Ex: } \frac{1}{x(x+1)} = \frac{(1+x)-x}{x(x+1)} = \frac{1}{x} - \frac{1}{x+1}$$

Ovanligt "lätt" exempel - använder trick!

Allmän metod:

$$\text{Ex (forts.): Partialbråksupplösa } \frac{4x+4}{(x-1)(x+3)^2} !$$

$$\text{Detta ger systemet} \quad \begin{cases} \frac{1}{2} + B = 0 \\ 6 \cdot \frac{1}{2} + 2B + 2 = 4 \\ 9 \cdot \frac{1}{2} - 3B - 2 = 4 \end{cases} \quad (5)$$

$$\text{Vilket ger } B = -\frac{1}{2}. \quad \text{Således } (4') \Leftrightarrow \begin{cases} A = \frac{1}{2} \\ B = -\frac{1}{2} \\ C = 2 \end{cases}$$

$$\text{Vi får} \quad \frac{4x+4}{(x-1)(x+3)^2} = \frac{\frac{1}{2}}{x-1} - \frac{\frac{1}{2}}{x+3} + 2 \cdot \frac{1}{(x+3)^2}$$

Ansätter vi rätt hittar vi alltid entydig lösning till systemet.

Steg IV (Bestäm primitiva funktioner)

$$\text{Ex (forts.): } \int \frac{x^5 + 5x^4 + 2x^3 - 14x^2 + x + 13}{x^3 + 5x^2 + 3x - 9} dx =$$

$$= \int x^2 - 1 dx + \frac{1}{2} \int \frac{1}{x-1} dx - \frac{1}{2} \int \frac{1}{x+3} dx +$$

$$+ 2 \int \frac{1}{(x+3)^2} dx = \frac{x^3}{3} - x + \frac{1}{2} \ln|x-1| - \frac{1}{2} \ln|x+3|$$

$$- \frac{2}{x+3} + C.$$

$$\text{Ex (I-IV): Bestäm } \int \frac{x^2 + 3x + 5}{x^4 - 2x^3 + 5x^2} dx !$$

I) Redan klart! $\deg f(x) < \deg g(x)$.

$$\text{II)} \int \frac{x^2+3x+5}{x^4-2x^3+5x^2} dx = \int \frac{x^2+3x+5}{x^2(x^2-2x+5)} dx \quad (5)$$

irr. över \mathbb{R}

III) Partialbråksupplösning:

$$\text{Ausätt } \frac{x^2+3x+5}{x^2(x^2-2x+5)} = \frac{A}{x} + \frac{B}{x^2} + \frac{Cx+D}{x^2-2x+5} \quad \text{obs!}$$

$$\Leftrightarrow x^2+3x+5 = Ax(x^2-2x+5) + B(x^2-2x+5) + (Cx+D)x^2$$

$$\Leftrightarrow x^2+3x+5 = (A+C)x^3 + (-2A+B+D)x^2 + (5A-2B)x + 5B$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} A + C = 0 \\ -2A + B + D = 1 \\ 5A - 2B = 3 \\ 5B = 5 \end{cases} \quad \begin{matrix} \text{(lättare lösningar)} \\ \Leftrightarrow \end{matrix} \quad \begin{cases} A = 1 \\ B = 1 \\ C = -1 \\ D = 2 \end{cases}$$

$$\text{IV)} \int \frac{x^2+3x+5}{x^4-2x^3+5x^2} dx = \int \frac{1}{x} dx + \int \frac{1}{x^2} dx +$$

$$+ \int \frac{-x+2}{x^2-2x+5} dx \stackrel{(*)}{=} \ln|x| - \frac{1}{x} - \frac{1}{2} \ln(x^2-2x+5) + \frac{1}{2} \arctan\left(\frac{x-1}{2}\right) + C$$

(*) $\int \frac{-x+2}{x^2-2x+5} dx$ bestämmes vi på följande sätt:

$$\int \frac{-x+2}{x^2-2x+5} dx \stackrel{\text{kvadratkompl.}}{=} \int \frac{-x+2}{(x-1)^2+4} dx = \underbrace{\text{alltid positiv!}}$$

$$= \ln|x| - \ln|x+1| + C = \ln(e^x) - \ln(e^x+1) + C = \quad (7)$$

$$= x - \ln(e^x+1) + C$$

$$\text{Ex: } I(x) = \int e^{3x} \cos x dx = e^{3x} \sin x - 3 \int e^{3x} \sin x dx =$$

$$= e^{3x} \sin x - 3 \left(e^{3x}(-\cos x) - 3 \int e^{3x}(-\cos x) dx \right) =$$

$$= e^{3x} \sin x + 3e^{3x} \cos x - 9 \int e^{3x} \cos x dx$$

$$\Leftrightarrow 10I(x) = e^{3x} \sin x + 3e^{3x} \cos x + C \quad \text{obs!}$$

$$\Leftrightarrow I(x) = \frac{e^{3x}}{10} (\sin x + 3\cos x) + C_1 \quad (C_1 = \frac{C}{10})$$

Ex (fr. förra förel.):

$$\int \sin 2x e^{\sin x} dx = \int 2 \sin x \cos x e^{\sin x} dx =$$

$$= \left[t = \sin x \quad \frac{dt}{dx} = \cos x \Rightarrow dt = \cos x dx \right] = \int 2te^t dt =$$

$$\begin{aligned} & \text{part.int.} \\ & \Downarrow 2te^t - \int 2e^t dt = 2te^t - 2e^t + C = \\ & = 2 \sin x e^{\sin x} - 2e^{\sin x} + C = 2e^{\sin x}(\sin x - 1) + C \end{aligned}$$

$$= \left[\begin{array}{l} t = x-1 \Rightarrow x = t+1 \\ \frac{dx}{dt} = 1 \Rightarrow dx = dt \end{array} \right] = \int \frac{-(t+1)+2}{t^2+4} dt =$$

$$= \int \frac{-t+1}{t^2+4} dt = \int \frac{-t}{t^2+4} dt + \int \frac{1}{t^2+4} dt =$$

$$= -\frac{1}{2} \int \frac{2t}{t^2+4} dt + \frac{1}{4} \int \frac{1}{t^2+1} dt =$$

$$= -\frac{1}{2} \ln(t^2+4) + \frac{1}{2} \arctan\left(\frac{t}{2}\right) + C =$$

$$= -\frac{1}{2} \ln(x^2-2x+5) + \frac{1}{2} \arctan\left(\frac{x-1}{2}\right) + C .$$

Anm: $\int \frac{Bx+C}{(x^2+ax+b)^n} dx$, där $n \geq 2$ och x^2+ax+b är icke-reduktabel över \mathbb{R}

kan bestämmas med en rekursionsformel, men ingår ej i kurserna.

$$\begin{aligned} \text{Ex: } \int \frac{1}{e^x+1} dx &= \left[\begin{array}{l} t = e^x \Rightarrow x = \ln t \\ \frac{dx}{dt} = \frac{1}{t} \Rightarrow dx = \frac{1}{t} dt \end{array} \right] = \\ &= \int \frac{1}{t(t+1)} dt = \int \frac{(1+t)-t}{t(t+1)} dt = \int \frac{1}{t} - \frac{1}{t+1} dt = \\ &\quad \xrightarrow{\text{rat. funkt i t}} \end{aligned}$$