

Föreläsning 19

(1)

Maclaurins formel (repetition):

Maclaurinutveckling av ordning n :

$$f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n + \frac{f^{(n+1)}(\beta)}{(n+1)!}x^{n+1}$$

$= P_n(x)$ Maclaurinpolynom $= R_{n+1}(x)$ Lagranges restterm

där β mellan 0 och x

(alt. $\beta = \theta x$ där $0 \leq \theta \leq 1$)

Ex: Ange Maclaurinutvecklingen av ordning 2 till

$$f(x) = \sqrt{1+x}$$

Lsg: $f(x) = \sqrt{1+x} \Rightarrow f(0) = 1$

$$f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{1+x}} \Rightarrow f'(0) = \frac{1}{2}$$

$$f''(x) = -\frac{1}{4(1+x)^{3/2}} \Rightarrow f''(0) = -\frac{1}{4}$$

$$f^{(3)}(x) = \frac{3}{8(1+x)^{5/2}} \Rightarrow f^{(3)}(\beta) = \frac{3}{8(1+\beta)^{5/2}}$$

$$\begin{aligned} \sqrt{1+x} &= 1 + \frac{1}{2}x + \frac{-\frac{1}{4}}{2!}x^2 + \frac{3}{8(1+\beta)^{5/2}}x^3 \\ &= 1 + \frac{1}{2}x - \frac{1}{8}x^2 + \frac{1}{16(1+\beta)^{5/2}}x^3 \quad \beta \text{ mellan } 0 \text{ och } x. \end{aligned}$$

Ex: Bestäm ett värde på integralen

$$\int_0^1 \sqrt{1+x^4} dx$$

med 2 decimalers noggrannhet.

Lsg:
$$\int_0^1 \sqrt{1+x^4} dx = \int_0^1 \left(1 + \frac{1}{2}x^4 - \frac{1}{8}x^8\right) dx + \underbrace{\int_0^1 \frac{1}{16(1+\theta x^4)^{5/2}}x^{12} dx}_{=\text{felet}}$$

Uppskattning av felet ger

$$0 \leq \int_0^1 \frac{1}{16} (1+\theta x^4)^{-5/2} x^{12} dx \leq \frac{1}{16} \int_0^1 x^{12} dx = (*)$$

$$\left. \begin{array}{l} 0 \leq \theta \leq 1 \\ 0 \leq x \leq 1 \end{array} \right\} \Rightarrow 0 \leq \theta x^4 \leq 1 \Rightarrow 1 \leq 1+\theta x^4 \leq 2$$

så $(1+\theta x^4)^{-5/2} = \frac{1}{(1+\theta x^4)^{5/2}} \leq 1$

$$(*) = \frac{1}{16} \left[\frac{1}{13} x^{13} \right]_0^1 = \frac{1}{208} < \frac{1}{200} = 0.005$$

Vidare
$$\int_0^1 \left(1 + \frac{1}{2}x^4 - \frac{1}{8}x^8\right) dx = \left[x + \frac{1}{10}x^5 - \frac{1}{72}x^9 \right]_0^1 = \frac{782}{720} \approx 1.0861, \text{ vilket ger}$$

• Om vi vill utveckla t.ex. $f(x) = \sqrt{1+x^4}$, blir det mer besvärligt, t.ex.

$$f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{1+x^4}} \cdot 4x^3$$

$$f''(x) = \text{kvotregeln, "krångliga räkningar"}$$

Vi kan då utnyttja följande sats:

Sats: Allt som "ser ut som" en Maclaurinutveckling är en Maclaurinutveckling.

Läs den matematiska formuleringen på s.256 i boken!

Ex: Vill vi utveckla $f(x) = \sqrt{1+x^4}$ till ordning 8 kan vi göra på följande sätt:

• Utveckla först $\sqrt{1+x}$:

$$\sqrt{1+x} = 1 + \frac{1}{2}x - \frac{1}{8}x^2 + \frac{1}{16(1+\theta x)^{5/2}}x^3 \quad (0 \leq \theta \leq 1)$$

• Ersätt sedan x med x^4 :

$$\sqrt{1+x^4} = 1 + \frac{1}{2}x^4 - \frac{1}{8}x^8 + \frac{1}{16(1+\theta x^4)^{5/2}}x^{12} \quad (0 \leq \theta \leq 1)$$

Euligt satsen ovan är detta Maclaurinpolynom av ordning 8 till $f(x) = \sqrt{1+x^4}$. Fungerar eftersom $x^4 \rightarrow 0$ då $x \rightarrow 0$ OBS!

(3)


$$1.0861 \approx \frac{782}{720} \leq \int_0^1 \sqrt{1+x^4} dx \leq \frac{782}{720} + 0.005 \approx 1.0911 \quad (4)$$

Svar: $\int_0^1 \sqrt{1+x^4} dx \approx 1.09$

Swagane form av resttermen

Repetition: En funktion $B(x)$ sägs vara begränsad i ett intervall I om det finns ett tal A så att

$$|B(x)| \leq A \Leftrightarrow -A \leq B(x) \leq A \text{ för alla } x \in I.$$



Speciellt: $B(x) = \frac{f^{(n+1)}(\theta x)}{(n+1)!}$ i Lagranges restterm

är begränsad i en omgivning av 0 (ty $f^{(n+1)}(x)$ kontinuerlig i en omgivning av 0.)

Lagranges restterm kan då skrivas $R_{n+1}(x) = B(x)x^{n+1}$ (5)

För vissa tillämpningar räcker det att skriva Maclaurins formel som

$$f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n + B(x)x^{n+1}$$

där $B(x)$ är begränsad nära $x=0$.

Ex: Beräkna

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - x}{x(e^x - 1 - x)}$$

Lsg:

sinx: $f(x) = \sin x$, $f'(x) = \cos x$, $f''(x) = -\sin x$, $f^{(3)}(x) = -\cos x$
 $\Rightarrow f(0) = 0$, $f'(0) = 1$, $f''(0) = 0$, $f^{(3)}(0) = -1$

så $\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + B_1(x)x^4 = x - \frac{x^3}{6} + B_1(x)x^4$ B_1 begr. nära 0

e^x : $g(x) = g'(x) = g''(x) = e^x \Rightarrow g(0) = g'(0) = g''(0) = 1$

så $e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + B_2(x)x^3$ B_2 begr. nära 0

Vi får $\frac{\sin x - x}{x(e^x - 1 - x)} = \frac{x - \frac{x^3}{6} + B_1(x)x^4 - x}{x(1 + x + \frac{x^2}{2} + B_2(x)x^3 - 1 - x)} =$

Vi får $\frac{x \sin x - \ln(1+x^2)}{x^4} =$ (7)

$$= \frac{x^2 - \frac{x^4}{6} + B_1(x)x^5 - (x^2 - \frac{x^4}{2} + B_2(x)x^6)}{x^4} = \frac{\frac{x^4}{3} + (B_1(x) - B_2(x)x)x^5}{x^4} = \frac{1}{3} + \underbrace{(B_1(x) - B_2(x)x)}_{=B_4(x) \text{ begr. nära } 0} x \rightarrow \frac{1}{3}$$

ty $B_4(x)x \rightarrow 0$ då $x \rightarrow 0$

Vi studerar Maclaurinutvecklingen av e^x :

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots + \frac{x^n}{n!} + \frac{e^{\theta x}}{(n+1)!}x^{n+1}, \quad 0 \leq \theta \leq 1.$$

Låt x vara fixt tal. Då gäller $\frac{x^{n+1}}{(n+1)!} e^{\theta x} \rightarrow 0$ då $n \rightarrow \infty$

Det följer att

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!} \quad \text{för alla reella } x.$$

Maclaurinserie!

På motsvarande sätt gäller:

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots = \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{k-1} \frac{x^{2k-1}}{(2k-1)!}$$

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \dots = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{x^{2k}}{(2k)!}$$

$$= \frac{-\frac{x^3}{6} + B_1(x)x^4}{\frac{x^3}{2} + B_2(x)x^4} \underset{\substack{\uparrow \text{dom.} \\ \text{term } x^3}}{=} \frac{-\frac{1}{6} + B_1(x)x}{\frac{1}{2} + B_2(x)x} \rightarrow \frac{-\frac{1}{6}}{\frac{1}{2}} = \underline{\underline{-\frac{1}{3}}} \quad (6)$$

då $x \rightarrow 0$

ty $B_1(x)x, B_2(x)x \rightarrow 0$ då $x \rightarrow 0$

Exempelvis $0 \leq |B_1(x)x| \leq Ax \rightarrow 0$ då $x \rightarrow 0$

så $B_1(x)x \rightarrow 0$ då $x \rightarrow 0$ (instängning) \square

Ex: Beräkna

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \sin x - \ln(1+x^2)}{x^4}$$

Lsg:

$x \sin x$: $x \sin x = x(x - \frac{x^3}{3!} + B_1(x)x^4) = x^2 - \frac{x^4}{6} + B_1(x)x^5$ B_1 begr. nära 0

$\ln(1+x^2)$: $f(x) = \ln(1+x)$, $f'(x) = \frac{1}{1+x}$, $f''(x) = -\frac{1}{(1+x)^2}$
 $\Rightarrow f(0) = 0$, $f'(0) = 1$, $f''(0) = -1$

så $\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + B_2(x)x^3$ B_2 begr. nära 0

$\Rightarrow \ln(1+x^2) = x^2 - \frac{x^4}{2} + \underbrace{B_2(x^2)x^6}_{=B_3(x) \text{ begr. nära } 0} = x^2 - \frac{x^4}{2} + B_3(x)x^6$
 ty $x^2 \rightarrow 0$ då $x \rightarrow 0$

för alla reella x . (8)

Man kan t.o.m. definiera e^z , $\sin z$ och $\cos z$ med hjälp av dessa serier. Detta är till hjälp om vi (naturligt) vill definiera funktionerna för komplexa tal. Vi definierar t.ex.

$$e^z = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{z^k}{k!}, \quad z \text{ komplext tal.}$$

Ex: Vad är e^{ix} då x reellt tal?

$$e^{ix} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(ix)^k}{k!} = 1 + ix + \frac{i^2 x^2}{2!} + \frac{i^3 x^3}{3!} + \frac{i^4 x^4}{4!} + \dots =$$

$$= 1 + ix - \frac{x^2}{2!} - \frac{ix^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + \frac{ix^5}{5!} + \dots =$$

$$= \left(1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \dots\right) + i \left(x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots\right) =$$

$$= \cos x + i \sin x \quad (!)$$