

Föreläsning 7

(1)

Taylorutveckling:

- Envariabelfallet, Taylorutveckling vid a ges av

$$f(a+h) = f(a) + f'(a) \cdot h + \frac{1}{2} f''(a) \cdot h^2 + \text{Restterm}$$

- I flervariabelfallet har vi flera partiella derivator att ta hänsyn till. För $f(x,y)$ vid punkten (a,b) får vi

$$f(a+h, b+k) = f(a,b) + f'_x(a,b) \cdot h + f'_y(a,b) \cdot k + \frac{1}{2} (f''_{xx}(a,b) \cdot h^2 + 2f''_{xy}(a,b) \cdot hk + f''_{yy}(a,b) \cdot k^2) + \text{Restterm}$$

$Q(h,k)$

Se Sats 10 (s.94) i boken. Beviset bygger på att återföra till envariabelfallet genom att studera $F(t) = f(a+t, b+kt)$.


(Repetera gärna Taylorutveckling från envariabelanalysen!)

Lokal extrempunkt:

(2)

Definieras på motsvarande sätt som i envariabelfallet, t.ex. så har vi ett lokalt maximum i (a,b) om det finns en omgivning O av punkten (a,b) sådant att


$$f(x,y) \leq f(a,b) \quad \text{för alla } (x,y) \text{ i } O.$$



Se Definition 7 (s.99) för mer detaljer.

Lokal extrempunkt = lokal max.punkt eller lokal min.punkt

Om vi har t.ex. ett lokat max. (en "topp") i (a,b) , och vi skär funktionsytan med planet $y=b$, så har den kurva vi då får ett "vanligt envariabel lok.max" i $x=a$.



Vi inser att $f'_x(a,b) = 0$!
På motsvarande sätt inser vi att även $f'_y(a,b) = 0$.

(3)

Sats (s.99):
 (a,b) lok. extr.punkt $\Rightarrow (\text{grad } f)(a,b) = (0,0) = \vec{0}$
 $\Leftrightarrow (a,b)$ inre punkt

Vi påminner om att $(\text{grad } f)(a,b) = (f'_x(a,b), f'_y(a,b))$
Om $(\text{grad } f)(a,b) = \vec{0}$ så kallas (a,b) stationär punkt.

Således: lok. extrempunkt \Rightarrow stationär punkt, (+ inre punkt)


men (obs!) stationär punkt $\not\Rightarrow$ lok. extrempunkt

Anm. Tänk på den "sadelyta" vi fick senast:

$$f(x,y) = x^2 - y^2$$

Vi har $\begin{cases} f'_x = 2x \\ f'_y = -2y \end{cases}$

så $(\text{grad } f)(0,0) = (0,0) = \vec{0}$,
men punkten $(0,0)$ är varken lok. max eller min.



Ex: Bestäm alla stationära punkter till

$$f(x,y) = x^2(1+y)^3 + y^2$$

Lösning: $\begin{cases} f'_x = 2x(1+y)^3 = 0 & \textcircled{1} \\ f'_y = 3x^2(1+y)^2 + 2y = 0 & \textcircled{2} \end{cases}$

$\textcircled{1}$ ger $x=0$ eller $y=-1$
 $x=0$ i $\textcircled{2}$ ger $2y=0 \Leftrightarrow y=0$
 $y=-1$ i $\textcircled{2}$ ger $-2=0$ salvar lsg.

Svar: $(x,y) = (0,0)$

Anm: Vi får i allmänhet inte linjära ekv.system, men får försöka lösa dem ändå.

Vi söker nu ett tillräckligt villkor för extrempunkter. Antag att (a,b) är en stationär punkt för $f(x,y)$. Taylorutveckling i (a,b) ger då

$$f(a+h,b+k) = f(a,b) + f'_x(a,b)h + f'_y(a,b)k + \frac{1}{2}Q(h,k) + \text{Restterm (mindre)}$$

$\Leftrightarrow f(a+h,b+k) - f(a,b) = \frac{1}{2}Q(h,k) + \text{Restterm (mindre)}$

Om vi skall ha t.ex. ett lok. max i (a,b) så måste den kvadratiska formen $Q(h,k)$ vara negativ: $f(a,b)$ ska vara större än $f(a+h,b+k)$!
(Observera att vi kan försumma resttermen då (h,k) är nära $(0,0)$.)

Fyra fall:

- 1) $Q(h,k) > 0$ för alla $(h,k) \neq (0,0)$
Vi säger då att $Q(h,k)$ är positivt definit.
 $\Rightarrow (a,b)$ (strängt) lokalt minimum
- 2) $Q(h,k) < 0$ för alla $(h,k) \neq (0,0)$
(negativt definit)

Vi ser att $Q(h,k)$ är pos. definit, så (7)

Svar: $(0,0)$ lok. min. punkt. \square

Om man inte direkt kan avgöra karaktären av $Q(h,k)$ måste man kvadratkomplettera:

- Ex:
- a) $h^2 + hk + k^2$
 - b) $h^2 + 2hk + k^2$
 - c) $-h^2 + 4hk - 3k^2$

Lsg.: a) $h^2 + hk + k^2 = (h + \frac{1}{2}k)^2 - (\frac{1}{2}k)^2 + k^2 = (h + \frac{1}{2}k)^2 + \frac{3}{4}k^2$ pos. definit

b) $h^2 + 2hk + k^2 = (h+k)^2$ pos. semidefinit

ty $(h+k)^2 = 0$ för t.ex. $(h,k) = (1,-1) \neq (0,0)$.

c) $-h^2 + 4hk - 3k^2 = -(h^2 - 4hk + 3k^2) = -(h-2k)^2 - (2k)^2 + 3k^2 = -(h-2k)^2 + k^2$

Denna antar både positiva och negativa värden!
indefinit. \square

Anm: Tecknen framför kvadraterna avgör karaktären!

Ex: Bestäm alla lok. extrempunkter till

$$f(x,y) = -2y^2 - 4xy - x^4.$$

Lös: Bestäm först stationära punkter:

$\Rightarrow (a,b)$ (strängt) lokalt maximum (6)

3) $Q(h,k)$ antar både positiva och negativa värden (indefinit)

$\Rightarrow (a,b)$ sadelpunkt (ej lok. extrempunkt)

4) $Q(h,k)$ är positiv (eller negativ) semidefinit, dvs. $Q(h,k) \geq 0$ och $Q(h,k) = 0$ för något $(h,k) \neq (0,0)$

\Rightarrow ingen slutsats kan dras.

Ex: Bestäm alla lok. extrempunkter till

$$f(x,y) = x^2(1+y)^3 + y^2.$$

Lsg: En lok. extrempunkt måste vara stationär, så enligt föreg. exempel är $(0,0)$ enda möjligheten.

Vi beräknar $Q(h,k)$ i denna punkt:

$$\begin{cases} f''_{xx} = 2(1+y)^3 \\ f''_{xy} = 6x(1+y)^2 \\ f''_{yy} = 6x^2(1+y) + 2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} f''_{xx}(0,0) = 2 \\ f''_{xy}(0,0) = 0 \\ f''_{yy}(0,0) = 2 \end{cases} \Rightarrow$$

$$Q(h,k) = f''_{xx} h^2 + 2f''_{xy} hk + f''_{yy} k^2 = 2h^2 + 2k^2$$

$$\begin{cases} f'_x = -4y - 4x^3 = 0 & \Leftrightarrow y = -x^3 & \textcircled{1} & \textcircled{8} \\ f'_y = -4y - 4x = 0 & \Leftrightarrow y = -x & \textcircled{2} \end{cases}$$

$\textcircled{2}$ insatt i $\textcircled{1}$ ger $-x = -x^3 \Leftrightarrow x(x^2-1) = 0$

$\Leftrightarrow x = 0, 1, -1$, vilket ger de stat. punkterna $(0,0), (1,-1), (-1,1)$.

Vi undersöker sedan dessa stat. punkter:

$$f''_{xx} = -12x^2, f''_{xy} = -4, f''_{yy} = -4$$

$(0,0)$: $Q(h,k) = 0 \cdot h^2 + 2 \cdot (-4)hk + (-4)k^2 = -8hk - 4k^2 = -4(k^2 + 2hk) = -4((k+h)^2 - h^2)$

$(1,-1)$: $Q(h,k) = -12h^2 - 8hk - 4k^2 = -4(k^2 + 2hk + 3h^2) = -4((k+h)^2 - h^2 + 3h^2) = -4(k+h)^2 - 8h^2$ neg. definit

$(-1,1)$: $Q(h,k)$ = samma som för $(1,-1)$ neg. definit

Svar: $(1,-1)$ och $(-1,1)$ är lokala max. punkter \square

För funktioner $f(x,y,z)$ används samma metod. Vi får då en funktion $Q(h,k,l)$ att undersöka (se även boken):

Ex: $Q(h,k,l) = h^2 + 2k^2 + 6l^2 + 2hk + 4hl + 6kl = (h+k+2l)^2 - (k+2l)^2 + 2k^2 + 6l^2 + 6kl = \dots = (h+k+2l)^2 + k^2 + 2l^2 + 2kl = (h+k+2l)^2 + (k+l)^2 - l^2 + 2l^2 = (h+k+2l)^2 + (k+l)^2 + l^2$

Arbeta systematiskt! pos. definit!